

28. No capítulo das onicoses, escolha a alternativa CORRETA:

- a) O ângulo de Lovibond (formado pela dobra ungueal proximal e lâmina ungueal) menor de 180° representa normalidade.
- b) O corpo glômico é um complexo especializado de anastomoses arteriovenosas localizados na derme do leito ungueal.
- c) O embrião, a partir da 10^a semana aproximadamente já inicia o processo de formação das dobras ungueais.
- d) As alternativas a, b e c estão corretas

29. Em relação ao melanoma lentiginoso acral está errado

- a) Pode iniciar como melanoníquia estriada
- b) A presenta faixas escuras irregulares e descontínuas
- c) O sinal de Hutchinson é muito característico
- d) A dermatoscopia pode ajudar na diferenciação com lesões benignas
- e) Acomete, principalmente o quinto pododáctilo, por ser mais susceptível a traumas

ATALHOS EM

DERMATOLOGIA

30. Manifestação ungueal mais comum da esclerose sistêmica:

- a) Sulcos de Beau
- b) Melanoníquia estriada
- c) Síndrome das unhas frágeis: onicorrexe, onicosquizia e hapaloníquia
- d) Onicogrifose

ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

31. Qual agente mais comum da paroníquia crônica:

- a) Candida
- b) Estafilococos
- c) Pseudomonas
- d) Dermatófitos



ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

GABARITO DAS QUESTÕES DE ONICOPATIAS

1.B	11.A	21.D	31.A
2.D	12.E	22.A	
3.D	13.E	23.E	
4.E	14.B	24.A	
5.E	15.C	25.C	
6.A	16.B	26.B	
7.B	17.B	27.A	
8.D	18.E	28.D	
9.C	19.C	29.E	
10.D	20.D	30.C	