





**3. Qual das doenças abaixo se caracteriza por apresentar eritema nodoso, uveíte e aftas:**

- a) síndrome de Reiter**
- b) síndrome de Behçet**
- c) síndrome de Sweet**
- d) penfigóide cicatricial**
- e) síndrome de Stevens-Johnson**

**4. Na dermatite neutrofílica aguda febril (S. Sweet), podemos dizer que:**

- a) é freqüente a associação com tuberculose cutânea**
- b) é freqüente a associação com melanoma**
- c) é mais freqüente em homens idosos**
- d) representa uma vasculite nos vasos da derme média e superficial**
- e) o tratamento de eleição é a talidomida**

ATALHOS EM

DERMATOLOGIA

**5. A erupção pustulosa que apresenta vasculite leucocitoclástica denomina-se:**

**a) pustulose de Sneddon-Wilkinson**

**b) psoríase pustulosa**

**c) foliculite eosinofílica**

**d) pustulose exantemática aguda generalizada**

**e) acrodermatite contínua de Hallopeau**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**6. Qual a droga de escolha no tratamento da pustulose subcórnea de Sneddon-Wilkinson ?**

- a) Dicloxacilina**
- b) Isotretinoína**
- c) Cefalosporina**
- d) Dapsona**
- e) Eritromicina**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**7. A síndrome de Sweet (dermatose neutrofílica aguda febril) pode ser precedida ou desencadeada por:**

- a) infecção das vias aéreas superiores**
- b) infecção gastrointestinal**
- c) vacinação com BCG**
- d) A e B corretas**
- e) A, B e C corretas**

**8. Em relação ao pioderma gangrenoso, é correto afirmar que:**

- a) raramente se associa a doenças sistêmicas**
- b) a diagnose é principalmente clínica**
- c) as alterações histopatológicas são patognomônicas**
- d) a lesão inicial é uma úlcera rasa**
- e) o uso de corticóide intralesional está contra-indicado**



**9. A etiologia da foliculite pustulosa eosinofílica é:**

**a) Staphylococcus aureus**

**b) Streptococcus pneumoniae**

**c) Desconhecida**

**d) Multifatorial**

**e) genética**



**10. A síndrome de Behçet, que é uma inflamação multissistêmica, encerra uma característica básica, que vem a ser:**

- a) artrite**
- b) nódulos acneiformes**
- c) ulcerações aftóides orais recorrentes**
- d) ulcerações genitais recorrentes**
- e) vasculite retiniana**

**11. Cicatriz cribiforme é característico de qual das doenças abaixo:**

**a) Pioderma gangrenoso**

**b) Hidrosadenite**

**c) Síndrome de Sweet**

**d) Behçet**

**e) Pustulose subcórnea**



**12. Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, queixando-se de lacrimejamento ocular e caroços vermelhos pelo corpo acompanhado de dor. Associado ao quadro apresenta religiosamente a cada 2 meses úlceras orais. Ao examinarmos a genitália notamos uma cicatriz. Diante dos achados, o diagnóstico mais provável é:**

- a) Behçet**
- b) Dermatose pustulosa subcórnea (doença de Sneddon-Wilkinson)**
- c) Pustulose exantemática aguda generalizada (PEAG)**
- d) Melanose pustulosa**

**13. Um exame que realizamos para confirmar o diagnóstico do caso anterior é:**


**a) Teste da Patergia**

**b) Teste de Frei**

**c) Teste de Wolf**

**d) Teste de Azulay**

**e) Teste de Sampaio**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**14. Diante do enorme arsenal terapêutico que temos para tratar Behçet. Qual das opções abaixo não se encontra como terapêutica da mesma:**

- a) Corticóide**
- b) Dapsona**
- c) Ciclosporina**
- d) PUVA**
- e) Tacrolimus**



**15. O pioderma gangrenoso pode estar associado as seguintes doenças abaixo, EXCETO:**

- a) leucemias**
- b) doenças inflamatórias do trato gastrointestinal**
- c) doença de Hodgkin**
- d) melanoma múltiplo**
- e) artrite**

**16. Todos abaixo são exemplos de critérios menores para o diagnóstico de pioderma gangrenoso, EXCETO:**

- a) Exclusão de outras causas de úlcera na pele**
- b) Patergia positivo**
- c) Histopatologia compatível**
- d) Resposta rápida à corticoterapia**
- e) Doenças sistêmicas comumente associadas**



**17. Sobre a síndrome de Sweet, marque a CORRETA:**

**a) Acomete mais mulheres jovens**

**b) Lesões mucosas ocorrem em 40% dos casos**

**c) A Histopatologia apresenta infiltrado dérmico sem vasculite**

**d) Todos os casos necessitam de tratamento sistêmico**

**e) A leucemia mielóide crônica está associada, principalmente quando as lesões se localizam na mucosa oral**

ATAIHOSEM  
DERMATOLOGIA

**18. É correto afirmar em relação ao tratamento da Síndrome de Sweet:**

- a) Corticoesteróides sistêmicos são o tratamento de escolha para a maioria dos casos**
- b) Corticoesteróide tópico ou intralesional nunca são utilizados**
- c) Indometacina é considerada agente de primeira linha**
- d) Colchicina e iodeto de potássio são terapias de segunda linha**
- e) NRA**

**19. O fenômeno patérgico ocorre no pioderma gangrenoso:**


**a) em todos os casos**

**b) em raros casos (<1%)**

**c) em aproximadamente 30% dos casos**

**d) apenas se há associação com doença linfoproliferativa**

**e) NRA**



**20. O eritema tóxico faz diagnóstico diferencial com:**

**a) Behçet**

**b) Pioderma gangrenoso**

**c) Melanose pustulosa**

**d) Foliculite eosinofílica**

**e) Sweet**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

# GABARITO DE DERMATOSSES NEUTROFILICAS

<b>1. B</b>	<b>11. A</b>
<b>2. C</b>	<b>12. A</b>
<b>3. B</b>	<b>13. A</b>
<b>4. D</b>	<b>14. D</b>
<b>5. D</b>	<b>15. D</b>
<b>6. D</b>	<b>16. A</b>
<b>7. E</b>	<b>17. C</b>
<b>8. B</b>	<b>18. A</b>
<b>9. C</b>	<b>19. C</b>
<b>10. C</b>	<b>20. C</b>