

40. Marque a alternativa **incorreta**:

- a) *Pseudomonas aeruginosa* pode ocasionar a síndrome das unhas verdes e ectima gangrenoso
- b) As células de Mikulicz são encontradas na histopatologia do rinoscleroma
- c) A dermatite perianal pode estar relacionada com psoríase gutata recidivante
- d) A dactilite bolhosa distal é mais frequente em adultos e idosos
- e) As lesões da úlcera tropical são dolorosas e localizam-se preferencialmente nos membros inferiores

41. Agente mais relacionado com a úlcera tropical:

a) *Borrelia vincenti*

b) *Haemophilus*

c) *Klebsiela*

d) *Fonsecae pedrosoi*

e) *NRA*



ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

42. Tratamento mais adequado da úlcera tropical:

- a) Penicilina cristalina
- b) Vancomicina
- c) Ciprofloxacina
- d) Fluconazol
- e) NRA



ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

43. São manifestações encontradas de forma mais frequente em pacientes negros:

- a) Foliculite queloidiana da nuca, ainhum, dermatose papulosa nigra
- b) Foliculite decalvante, quelóide, hiperpigmentação gengival
- c) Pseudofoliculite da barba, rosácea, psoríase em gotas
- d) Foliculite dissecante, ictiose adquirida, quelóide

ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

44. Sobre as piodermites é VERDADEIRO:

- a) O impetigo bolhoso pode ter etiologia estafilocócica e estreptocócica com frequência
- b) A toxina esfoliativa B não participa na patogênese da SSSS
- c) O calázio é a infecção aguda superficial das glândulas de Meibomius
- d) A ectima pode ter etiologia estrepto ou estrepto-estafilocócica



ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

45. Criança com 10 dias de vida, após quadro de otite e febre, apresentou eritema cutâneo difuso e formação de bolhas flácidas que, ao se romperem, originaram destacamento da epiderme e formação de grandes áreas erosadas em toda a superfície cutânea. No exame histopatológico, observou-se clivagem alta no nível da camada granulosa. Neste caso, o diagnóstico mais provável é:

- a) Necrolise epidérmica tóxica
- b) Síndrome de Stevens-Johnson
- c) Síndrome da pele escaldada estafilocócica
- d) Dermatite por IgA linear

46. Marque a alternativa CORRETA:

- a) Tanto a angiomatose bacilar quanto a doença da arranhadura do gato são causadas pela *Bartonella henselae* e as duas doenças tem relação com imunossupressão
- b) A síndrome do choque tóxico é específica da infecção pelo *S. aureus*
- c) A sicosose da barba é uma infecção superficial dos pelos que pode evoluir com alopecia cicatricial. Pode ser causada por bactéria, fungos e vírus
- d) A pústula maligna é zoonose de notificação compulsória.
- e) Na botriomicose caracteriza-se pela presença de tumoração com fístula e eliminação de pus. O exame direto é importante pelo achado de hifas hialinas, que confirma seu diagnóstico

47. Lactente de um mês foi trazido ao consultório com quadro de febre baixa e “bolhas na bochecha” há três dias. Ao exame, encontrava-se febril, irritado, com vesículas de conteúdo purulento confluentes, bolhas flácidas e crostas amarelo-acastanhadas na região perinasal e malar. Não apresentava sinal de Nikolsky. Mãe informa que quadro iniciou com pequenas bolhas que rapidamente cresceram e romperam e que o seu sobrinho apresentou o mesmo quadro há dez dias. O diagnóstico provável é:

- a) pênfigo vulgar;
- b) impetigo estafilocócico;
- c) dermatite de contato alérgica;
- d) impetigo estreptocócico;
- e) síndrome da pele escaldada

48. São características do impetigo estreptocócico **exceto:**

- a) Ocorrência em menores de 2 anos
- b) Pode evoluir com nefrite
- c) Aspecto melicérico
- d) Crostas espessas
- e) ASLO elevada



ATALHOS EM
DERMATOLOGIA

GABARITO DA AULA DE PIODERMITES

1.B	11.C	21.A	31.A	41.A
2.B	12.C	22.C	32.D	42.A
3.D	13.A	23.D	33.C	43.A
4.A	14.B	24.C	34.B	44.D
5.A	15.A	25.C	35.C	45.C
6.C	16.D	26.B	36.E	46.D
7.D	17.B	27.A	37.A	47.B
8.B	18.B	28.D	38.D	48.E
9.A	19.C	29.B	39.B	
10.C	20.A	30.C	40.D	